

**TREŚĆ OZNAKOWANIA OPAKOWANIA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO
FENDONA 6 SC**

Podmiot odpowiedzialny: BASF Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 142b, 02-305
Warszawa, tel.: 22 570 99 99, fax: 22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com

FENDONA 6 SC

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie – ulotce informacyjnej

Koncentrat owadobójczy w postaci stężonej zawiesiny. Wykazuje działanie kontaktowe i pokarmowe.

Zawartość substancji czynnej:

alfa-cypermetryna - 60 g/l

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 3022/06

**UWAGA**

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera: 1,2
BENZOIZOTIAZOL-3(2H)- ON

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 Chronić przed dziećmi.

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.

P391 Zebrać wyciek

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Zawiera: alfa-cypermetrynę. Może powodować parestezję..

ZAKRES STOSOWANIA I DAWKI

Preparat przeznaczony jest do zwalczania owadów latających i biegających oraz pajączaków w higienie sanitarnej: much, komarów, prusaków, karaluchów, mrówek faraona, pluskiew, pcheł, omacnicy spichrzanki (mól spożywczy), kleszczy. FENDONA 6 SC może być stosowana w pomieszczeniach mieszkalnych, w obiektach użyteczności publicznej takich jak: biura, przychodnie, szpitale (także na salach chorych, z wyłączeniem sal operacyjnych), szkoły, internaty, koszary wojskowe, ośrodki wczasowe, hotele, kawiarnie, restauracje, kina, teatry, sklepy, w magazynach (z wyjątkiem żywnościowych), w zakładach przemysłowych, w tym rolno-spożywczych, mięsnych oraz mleczarskich (z wyjątkiem strefy produkcyjnej), w pomieszczeniach inwentarskich, takich jak: chlewnie, obory, stajnie i kurniki, oraz w środkach transportu: na pokładach samolotów, na statkach, w pociągach, itp.

Preparat przeznaczony jest również do zwalczania komarów i kleszczy na zewnątrz budynków pod warunkiem, że nie zostanie usunięty poprzez niekorzystne warunki atmosferyczne.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż -10°C i nie wyższej niż 40°C, z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dostępem wilgoci.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Unikać przebywania w zasięgu rozpryskiwanej cieczy użytkowej.
Nie stosować w pomieszczeniach, w których przebywają osoby szczególnie wrażliwe tj. małe dzieci, osoby chore, starsze i alergicy.
Chronić środki spożywcze, naczynia na żywność i pasze przed skażeniem preparatem.
Przed wykonaniem zabiegu trzeba je usunąć z pomieszczeń lub dokładnie okryć.
Nie opryskiwać łóżeczek dziecięcych, pościeli i zabawek.
Przy przeprowadzaniu dezynsekcji w pomieszczeniach inwentarskich wyprowadzić zwierzęta na czas wykonania zabiegu.
Opryskiwać chlewnie począwszy od wysokości powyżej 1,5 m w górę, a obory począwszy 2 m w górę od podłogi.
Pomieszczenie jest zdadne do użytkowania po wyschnięciu opryskanych powierzchni i starannym przewietrzeniu.
Nie stosować preparatu na żłoby i poidła oraz inne powierzchnie, z którymi mogą kontaktować się zwierzęta.
Pozamykać okna i drzwi celem uniknięcia znoszenia preparatu przez przeciągi.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Okres ważności – 2 lata od daty produkcji
Data produkcji
Zawartość netto:
Nr serii:

Przed przystąpieniem do pracy z produktem biobójczym FENDONA 6 SC zapoznać się z dołączoną ulotką informacyjną.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 131C, 02-222 Warszawa
NIP: 521-32-14-102 REGON: 015249601

Z upoważnienia Prezesa
WICEPREZES
ds. Produktów Biobójczych

Barbara Jąworska-Luczak

2018-12-31

ULOTKA INFORMACYJNA

Podmiot odpowiedzialny: BASF Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 142b, 02-305 Warszawa, tel.: 22 570 99 99, fax: 22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com

FENDONA 6 SC

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w etykiecie – ulotce informacyjnej

Koncentrat owadobójczy w postaci stężonej zawiesiny. Wykazuje działanie kontaktowe i pokarmowe.

Zawartość substancji czynnej:
alfa-cypermetryna - 60 g/l

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 3022/06

**UWAGA**

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera: 1,2 BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 Chronić przed dziećmi.

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.

P391 Zebrać wyciek

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Zawiera: alfa-cypermetrynę. Może powodować parestezję.

ZAKRES STOSOWANIA I DAWKI

Preparat przeznaczony jest do zwalczania owadów latających i biegających oraz pajęczaków w higienie sanitarnej: much, komarów, prusaków, karaluchów, mrówek faraona, pluskiew, pcheł, omacnicy spichrzanki (mól spożywczy), kleszczy. FENDONA 6 SC może być stosowana w pomieszczeniach mieszkalnych, w obiektach użyteczności publicznej takich jak: biura, przychodnie, szpitale (także na salach chorych, z wyłączeniem sal operacyjnych), szkoły, internaty, koszary wojskowe, ośrodki wczasowe, hotele, kawiarnie, restauracje, kina, teatry, sklepy, w magazynach (z wyjątkiem żywnościowych), w zakładach przemysłowych, w tym rolno-spożywczych, mięsnych oraz mleczarskich (z wyjątkiem strefy produkcyjnej), w pomieszczeniach inwentarskich, takich jak: chlewnie, obory, stajnie i kurniki, oraz w środkach transportu: na pokładach samolotów, na statkach, w pociągach, itp.

Preparat przeznaczony jest również do zwalczania komarów i kleszczy na zewnątrz budynków pod warunkiem, że nie zostanie usunięty poprzez niekorzystne warunki atmosferyczne.

Stosować preparat w stężeniu 0,5% (25 ml preparatu zmieszać z 5 l wody).

W wyjątkowych przypadkach, np. przy liczonym zasiedleniu pomieszczeń inwentarskich przez muchy, lub dużej porowatości powierzchni opryskiwanej, a także w przypadku zwalczania

pluskiew, pcheł, moli spożywczych i kleszczy stężenie należy zwiększyć do 1,0% (50 ml preparatu zmieszać z 5 l wody). 1 litr cieczy roboczej wystarcza na opryskanie 20 m² powierzchni

SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy roboczej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną objętość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą i wymieszać dokładnie, następnie uzupełnić wodą do potrzebnej objętości i znowu wymieszać dokładnie.

Zamknąć opryskiwacz i wymieszać do powstania jednorodnej zawiesiny, po czym niezwłocznie wykonać opryskiwanie.

Jeżeli wystąpią dłuższe przerwy w wykonywaniu zabiegu należy ponowić mieszanie przed każdorazowym opryskiwaniem.

W celu zwalczania komarów i kleszczy na zewnątrz budynków można również zastosować metodę zimnej mgły z użyciem specjalistycznego sprzętu umożliwiającego wytworzenie kropli o wartości średniej średnicy objętościowej (VMD) w granicach od 5 do 25 µm.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

SPOSÓB WYKONANIA ZABIEGU

Zabieg może być wykonany za pomocą większości typów opryskiwaczy dostosowanych do opryskiwania grubokroplistego pod niskim ciśnieniem.

Podstawową zasadą właściwego wykonania zabiegu jest dokładne pokrycie cieczą (do momentu początku minimalnego jej ściekania) powierzchni dezynsektowanych – ścian, podłóg oraz zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni budynków, po których owady biegają lub na których siadają.

- W przypadku zwalczania prusaków szczególną uwagę zwrócić należy na miejsca gnieźdzenia się owadów (naroża ścian, szpary w podłodze, szczeliny w murze zwłaszcza przejścia przewodów i rur, miejsca za listwami, tapetami, tylne części mebli i obrazów, okapy).
- W przypadku zwalczania much w pomieszczeniach inwentarskich opryskiwać należy powierzchnie, na których muchy najchętniej przebywają, jak nasłonecznione fragmenty ścian, okolice okien, lamp, słupy nośne, przegrody itp. Wskazane jest również opryskiwanie miejsc składania odpadów (o ile nie są one wykorzystywane, jako karma dla zwierząt) oraz innych miejsc, w których wylęgają się owady.
- W przypadku zwalczania komarów na zewnątrz należy opryskiwać powierzchnie, na które najchętniej siadają owady np. zewnętrzne powierzchnie budynków, ościeżnice drzwi i okien, zacienione okapy, powierzchnie altanek, podesty, murowane ogrodzenia, płoty drewniane i inne. Powierzchnie wyeksponowane na silną operację słoneczną należy opryskiwać wcześniej z rana, pozostałe rano lub późnym popołudniem. Wszystkie powierzchnie opryskiwane przed zabiegiem powinny być suche.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż -10°C i nie wyższej niż 40°C, z dala od źródeł ciepła.

Chronić przed dostępem wilgoci.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Unikać przebywania w zasięgu rozpryskiwanej cieczy roboczej.

Nie stosować w pomieszczeniach, w których przebywają osoby szczególnie wrażliwe tj. małe dzieci, osoby chore, starsze i alergicy.

Chronić środki spożywcze, naczynia na żywność i pasze przed skażeniem preparatem. Przed wykonaniem zabiegu trzeba je usunąć z pomieszczeń lub dokładnie okryć.

Nie opryskiwać łóżeczek dziecięcych, pościeli i zabawek.

Przy przeprowadzaniu dezynsekcji w pomieszczeniach inwentarskich wyprowadzić zwierzęta na czas wykonania zabiegu.

Opryskiwać chlewnie począwszy od wysokości powyżej 1,5 m w górę, a obory począwszy 2 m w górę od posadzki.

Pomieszczenie jest zdadne do użytkowania po wyschnięciu opryskanych powierzchni i starannym przewietrzeniu.

Nie stosować preparatu na żłoby i poidła oraz inne powierzchnie, z którymi mogą kontaktować się zwierzęta.

Pozamykać okna i drzwi celem uniknięcia znoszenia preparatu przez przeciągi.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PRODUKTU I OPAKOWANIA

Opróżnione opakowania po preparacie zwrócić do sprzedawcy, u którego preparat został zakupiony.

Zabrania się spalania opakowań po preparacie we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po preparacie do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

PIERWSZA POMOC I INFORMACJA DLA LEKARZA

Wdychanie: spokój, świeże powietrze

Kontakt ze skórą: Zmyć dokładnie wodą z mydłem.

Kontakt z oczami: Płukać przez 15 min pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach.

Połknięcie: Wypłukać usta i popić dużą ilością wody.

Wskazówki dla lekarza:

- Symptomy: odrętwienie oraz mrowienie rąk i stóp, odma płucna, skurcze
- Postępowanie: leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych)

Okres ważności – 2 lata od daty produkcji

Data produkcji:

Zawartość netto:

Nr serii:

Z upoważnienia Prezesa
WICEPREZES
ds. Produktów Biobójczych

Barbara Jaworska-Luczak

2018 -12- 3 1

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
NIP: 521-32-14-182 REGON: 015249801